



# RGT Sacramento



Obtenteur : RAGT Seeds UK  
 Mandataire : Limagrain Belgium  
 Année de 1<sup>ère</sup> inscription : 2014  
 Pays d'inscription : UK

## Rendements

Adaptation régionale (avec protection)

Rendements en fonction des années et des conduites culturales

Hainaut	97,6 %
Hesbaya	95,4 %
Condroz	98,4 %

Rendements relatifs en fonction des moyennes des essais

	2018	2017	2016	2015	Moyenne	Nombre d'essais
Ni fongicide ni régulateur	111,3	107,5	96,9	106,0	103,3	33
Protection complète	93,5	102,6	91,1	102,3	96,9	31

Perte moyenne de rendement en l'absence de protection fongicide et de régulateur

	2018	2017	2016	2015	Moyenne sur l'ensemble des essais **	
Perte en rendement (%)	9,7	3,5	26,0	8,5	17,1	%
Perte en rendement (Kg/ha)	972	373	2071	955	1440	Kg/ha
Perte financière (€/ha)*	175	67	373	172	259	€/ha

\*pour un prix de vente du fr 180 €/T

\*\* Nombre d'essais = 14

La perte financière correspond à la diminution de rendement en l'absence de protection mais également au coût maximum des traitements pour que cette protection demeure rentable.

## Précocité, maturité et date de semis

Saisonnalité		
Résistance au froid		
Précocité à la montaison	5,0	Demi-précoce
Précocité à l'épiaison	3,2	Précoce

Maturité	4,8	Demi-précoce
Tenue à l'égrenage		
Résistance à la germination		

Adéquation de la période de semis

0	0	0	0	0
Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février

3	Favorable
2	
1	Défavorable

Recommandations pour le semis et la récolte :

Variété précoce : ne pas semer trop tôt. Variété bien adaptée aux régions situées au sud du sillon Sambre-et-Meuse.



# RGT Sacramento

## Comportement face aux maladies, ravageurs et herbicides

Rouille jaune	8,3
Rouille brune	8,2
Oïdium	5,9
Septoriose ( <i>S. tritici</i> )	5,3
Septoriose ( <i>S. nodorum</i> )	
DTR	
Fusariose des feuilles	6,9
Piétin verse	
Piétin échaudage	

Fusarioses sur épis (cote globale)	4,2
Fusariose sur épis ( <i>F. graminearum</i> )	5,4
Fusariose sur épis ( <i>M. nivale</i> )	3,4
Septoriose des épis	


Cécidomyie orange	Sensible
Sensibilité au chlortoluron :	0,0

Recommandations en terme de protection de la culture :

Variété sensible à la septoriose et aux maladies d'épis. Variété à protéger.

## Caractéristiques des tiges

Hauteur (cm)	90	Moyenne
Capacité de tallage	5,4	Faible
Rendement en paille (% des témoins)	84	Très faible
Verse	8,0	Résistante



Raccourcisseurs : Tolérance moyenne à la verse. Un raccourcisseur suffit en conditions normales de fumure.

## Caractéristiques des grains

Poids de l'hectolitre (kg)	76	Moyen
Poids de mille grains (g)	47	Moyen
Teneur en protéine (%)	11,7	Elevée
Zélény (ml)	33	Moyen
Z/P	2,9	Moyen
Hagberg (s)	325	Moyen

Qualité :

Variété fourragère

Alvéographe de Chopin

W (10E-4J)	
P/L	

