



Olympus



Obtenteur : Deutsche Saatveredelung UK
 Mandataire : Ets Rigaux
 Année de 1^{ère} inscription : 2014
 Pays d'inscription : UK, DK

Rendements

Adaptation régionale (avec protection)

Rendements en fonction des années et des conduites culturales

Hainaut	96,9 %
Hesbaye	95,3 %
Condroz	94,0 %

Rendements relatifs par rapport à la moyenne des témoins*

	2019	2018	2017	2016	2015	Moyenne	Nombre d'essais
Ni fongicide ni régulateur	-	109,0	97,0	105,1	-	104,2	18
Protection complète	-	97,3	94,8	94,6	-	95,5	37

*Les témoins considérés sont : Bergamo, Graham, KWS Smart et Mentor

Perte moyenne de rendement en l'absence de protection fongicide et de régulateur

	2019	2018	2017	2016	2015	Moyenne globale **	
Perte en rendement (%)	-	19,3	4,5	16,3	-	14,6	%
Perte en rendement (Kg/ha)	-	2184	471	1340	-	1428	Kg/ha
Perte financière (€/ha)*	-	393	85	241	-	257	€/ha

*pour un prix de vente du fr : 180 €/T

** Nombre d'essais = 9

La perte financière correspond à la diminution de rendement en l'absence de protection mais également au coût maximum des traitements pour que cette protection demeure rentable.

Précocité, Maturité et date de semis

Saisonalité	
Résistance au froid	
Précocité à la montaison	8,0 Tardif
Précocité à l'épiaison	7,0 Tardif

Maturité	3,4	Précoce
Tenue à l'égrenage		
Résistance à la germination		

Adéquation de la période de semis

0	0	0	0	0
Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février

3	Favorable
2	
1	Défavorable

Recommandations pour le semis et la récolte :

0



Olympus

Comportement face aux maladies, ravageurs et herbicides

Rouille jaune	8,9
Rouille brune	8,1
Oïdium	8,5
Septoriose (<i>S. tritici</i>)	7,2
Septoriose (<i>S. nodorum</i>)	
DTR	
Fusariose des feuilles	6,7
Piétin verse	
Piétin échaudage	

Fusarioses sur épis (cote globale)	5,9
Fusariose sur épis (<i>F. graminearum</i>)	6,3
Fusariose sur épis (<i>M. nivale</i>)	6,8
Septoriose des épis	


Cécidomyie orange	Sensible
Sensibilité au chlortoluron :	0,0

Recommandations en terme de protection de la culture :

Variété très tolérante à l'ensemble des maladies et particulièrement bien adaptée à une conduite faible intrant.

Caractéristiques des tiges

Hauteur (cm)	91	Moyenne
Capacité de tallage	4,2	Faible
Rendement en paille (% des témoins)	87	Très faible
Verse	8,3	Résistante



Raccourcisseurs :

0

Caractéristiques des grains

Poids de l'hectolitre (kg)	74	Faible
Poids de mille grains (g)	49	Moyen
Teneur en protéine (%)	11,4	Moyenne
Zélény (ml)	30	Faible
Z/P	2,5	Faible
Hagberg (s)		Très élevé

Qualité :

Variété fourragère

Alvéographe de Chopin

W (10E-4J)	
P/L	



Date de mise à jour : 11-09-19