



Informer



Obtenteur : Saatzucht Josef Breun DE
 Mandataire : Ets Rigaux
 Année de 1^{ère} inscription : 2018
 Pays d'inscription : SE, DK, DE, N

Rendements

Adaptation régionale (avec protection)

Rendements en fonction des années et des conduites culturales

| | | |
|---------|------|---|
| Hainaut | 98,6 | % |
| Hesbaye | 99,1 | % |
| Condroz | 99,1 | % |

Rendements relatifs en fonction des moyennes des essais

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne | Nombre d'essais |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|-----------------|
| Ni fongicide ni régulateur | 103,2 | 102,8 | 100,9 | 99,7 | 101,7 | 27 |
| Protection complète | 96,6 | 99,8 | 98,1 | 102,6 | 98,9 | 47 |

Perte moyenne de rendement en l'absence de protection fongicide et de régulateur

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur l'ensemble des essais ** | |
|----------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------|-------|
| Perte en rendement (%) | 8,2 | 5,9 | 15,1 | 29,5 | 13,9 | % |
| Perte en rendement (Kg/ha) | 796 | 759 | 1842 | 3693 | 1671 | Kg/ha |
| Perte financière (€/ha)* | 143 | 137 | 331 | 665 | 301 | €/ha |

*pour un prix de vente du fr. 180 €/T

** Nombre d'essais = 25

La perte financière correspond à la diminution de rendement en l'absence de protection mais également au coût maximum des traitements pour que cette protection demeure rentable.

Précocité, Maturité et date de semis

| | | | | |
|--------------------------|-----|-----------------------------|-----|-------------|
| Saisonalité | | Maturité | 9,0 | Très tardif |
| Résistance au froid | | Tenue à l'égrenage | | |
| Précocité à la montaison | 6,0 | Résistance à la germination | | |
| Précocité à l'épiaison | 8,0 | | | |

Adéquation de la période de semis

| | | | | |
|---------|----------|----------|---------|---------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février |

| | |
|---|-------------|
| 3 | Favorable |
| 2 | |
| 1 | Défavorable |

Recommandations pour le semis et la récolte :

0



Informer

Comportement face aux maladies, ravageurs et herbicides

| | |
|----------------------------------|-----|
| Rouille jaune | 8,8 |
| Rouille brune | 6,7 |
| Oïdium | 8,8 |
| Septoriose (<i>S. tritici</i>) | 6,8 |
| Septoriose (<i>S. nodorum</i>) | |
| DTR | |
| Fusariose des feuilles | 5,4 |
| Piétin verse | |
| Piétin échaudage | |


| | |
|--|----------|
| Fusarioses sur épis (cote globale) | 5,4 |
| Fusariose sur épis (<i>F. graminearum</i>) | |
| Fusariose sur épis (<i>M.nivale</i>) | |
| Septoriose des épis | |
| Cécidomyie orange | Sensible |
| Sensibilité au chlortoluron : | Tolérant |

Recommandations en terme de protection de la culture :

0

Caractéristiques des tiges

| | | |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| Hauteur (cm) | 104 | Haute |
| Capacité de tallage | 6,0 | Moyenne |
| Rendement en paille (% des témoins) | 113 | Très élevé |
| Verse | 7,1 | Assez résistante |



Raccourcisseurs :

0

Caractéristiques des grains

| | | |
|----------------------------|------|------------|
| Poids de l'hectolitre (kg) | 75 | Faible |
| Poids de mille grains (g) | 50 | Moyen |
| Teneur en protéine (%) | 11,6 | Elevée |
| Zélény (ml) | 40 | Elevé |
| Z/P | 3,4 | Elevé |
| Hagberg (s) | 376 | Très élevé |

Qualité :

0

Alvéographe de Chopin

| | |
|------------|--|
| W (10E-4J) | |
| P/L | |



Wallonie